


Varningstecken hos VUXNA

Stämmer ett eller flera av följande varningstecken, bör utredning avseende nedsättning av immunförsvaret övervägas:

- 1** Fyra eller fler luftvägsinfektioner per år under 2-3 år. Infektionerna drabbar oftast öron, bihålor, luftrör samt lungor. Infektionerna ska ha krävt behandling med antibiotika.
- 2** Dålig effekt, utebliven effekt eller upprepade återfall vid behandling med antibiotika.
- 3** Två eller fler svåra infektioner orsakade av bakterier, såsom benröta, hjärnhinneinflammation, blodförgiftning eller infektioner i kroppens mjukdelar.
- 4** Två eller fler bihåle- eller lunginflammationer under en treårsperiod. Infektionerna ska ha påvisats med röntgenundersökning.
- 5** Infektioner på ovanliga ställen i kroppen och/eller infektioner som är orsakade av ovanliga smittämnen.
- 6** Känd primär immunbristsjukdom i familjen.

10 varningstecken hos BARN

Stämmer ett eller flera av följande varningstecken, bör utredning avseende nedsättning av immunförsvaret övervägas:



1. Sex eller fler öroninflammationer per år. Öroninflammation med åtföljande hål i trumhinnan eller inflammation i klippbenets utskott bakom örat (mastoidit).



2. Två eller fler bihåleinflammationer per år.



3. Infektioner som inte läker på förväntat sätt under antibiotikabehandling.



4. Två eller fler lunginflammationer per år.



5. Dålig längd-/viktökning hos barn.



6. Återkommande infektioner som t ex varbölder i hud och/eller andra organ.



7. Långvarig uttalad svampinfektion i munhålan (muntorsk) eller på huden.



8. Infektioner på ovanliga ställen i kroppen och/eller infektioner som är orsakade av ovanliga smittämnen.



9. Två eller fler djupgående infektioner såsom hjärnhinneinflammation (meningit), benröta eller blodförgiftning.



10. Känd primär immunbristsjukdom i familjen.